



# Erupción de los dientes y dentición

## Erupción de los dientes

Hacia los 6 meses de edad, comienzan a salir los primeros dientes de los bebés. Normalmente, los dientes delanteros inferiores son los primeros en salir seguidos de los dientes delanteros superiores. De los 2 a los 2 años y medio de edad, la mayoría de los niños ya tienen los 20 dientes de leche.

A los 6 o 7 años de edad, es cuando comienzan a salir los dientes permanentes. Generalmente, los dientes delanteros inferiores y los primeros molares son los primeros dientes permanentes en salir.



DIENTES DE LECHE			
	<b>Upper Teeth</b>	<b>Erupt</b>	<b>Shed</b>
	Central incisor	8-12 mos.	6-7 yrs.
	Lateral incisor	9-13 mos.	7-8 yrs.
	Canine (cuspid)	16-22 mos.	10-12 yrs.
	First molar	13-19 mos.	9-11 yrs.
	<b>Lower Teeth</b>	<b>Erupt</b>	<b>Shed</b>
	Second molar	23-31 mos.	10-12 yrs.
	First molar	14-18 mos.	9-11 yrs.
	Canine (cuspid)	17-23 mos.	9-12 yrs.
	Lateral incisor	10-16 mos.	7-8 yrs.
	Central incisor	6-10 mos.	6-7 yrs.

## Síntomas de dentición

Su hijo puede tener las encías adoloridas al momento de la erupción del diente. Algunos síntomas normales de la dentición incluyen:

- Salivar más de lo normal
- Comportamiento irritable
- Llanto
- No poder dormir bien
- Pérdida del apetito

La diarrea, el sarpullido, y la fiebre no son síntomas normales en un bebé cuando le están por salir los dientes. Si su bebé tiene cualquiera de estos síntomas durante la dentición o continúa estando irritable, llame a su médico.

DIENTES		
	<b>Upper Teeth</b>	<b>Erupt</b>
	Central incisor	7-8 yrs.
	Lateral incisor	8-9 yrs.
	Canine (cuspid)	11-12 yrs.
	First premolar (first bicuspid)	10-11 yrs.
	Second premolar (second bicuspid)	10-12 yrs.
	First molar	6-7 yrs.
	<b>Lower Teeth</b>	<b>Erupt</b>
	Third molar (wisdom tooth)	17-21 yrs.
	Second molar	12-13 yrs.
	First molar	6-7 yrs.
	Second premolar (second bicuspid)	11-12 yrs.
	First premolar (first bicuspid)	10-12 yrs.
	Canine (cuspid)	9-10 yrs.
	Lateral incisor	7-8 yrs.
	Central incisor	6-7 yrs.

*Tablas reimpresas con el permiso de la American Dental Association*

## Lo que DEBE y NO DEBE hacerse durante la dentición

SÍ, frote suavemente las encías de su hijo con el dedo limpio o con algo frío como una cuchara pequeña o un paño húmedo.

SÍ use anillos de dentición macizos.

NO use anillos de dentición de plástico con rellenos líquidos. Su hijo podría morder y perforar el plástico.

NO use galletas para la dentición. Esto puede aumentar el riesgo de caries de su hijo.

NO use ningún medicamento para las encías de su hijo sin la recomendación de su dentista o médico.